

-□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ -

மழகைக் காலத்தில் நாம் கண்டு பயப்படும் இன்னொரு நோய் டெங்கு காய்ச்சல். அறுபதுகளின் துவக்கத்தில் 'பிங்கி' ஜூரம் என அறிமுகமான இந்நோய் வந்த சீ சனில்தான் "ஸ்டவ் ஜோசியம்" என்பதும் அறிமுகமானது. 'பிங்கி' என்ற பெயரால் பல நகைச்சுவைத் துணுக்குகள் உருவாயின. ஆனால், அதன் சரியான பெயர் 'டெங்கு' என்பதே.

இந்நோய் ஏற்படக் காரணமாக உள்ளது டெங்கு நுண்ணியே. (நுண்ணி என்பது வரைஸ்தாங்க... தமிழ் மொழி பெயர்ப்பாளர்கள் நுண்கிருமி என்றால் பாக்டீரியா, அதிநுண்கிருமி என்பது வரைஸ் அதாவது நுண்ணி என்கிறார்கள்)

இவை ஊன்நீர் வகைகளாகப் (Serotypes) பிரித்தால் நான்கு வகைப்படும். அதில் என்ன விசேஷம் என்கிறீர்கள்? அதைப் பிறகு சொல்கிறேன். இவை வயது, பால், இனம் ஆகிய வேறுபாடுபார்க்காமல் எல்லோரையும் ஒன்றாகத் தாக்கும்.

இவற்றைப் பரப்பும் கொசுக்களை 'ஈடஸ் ஈஜிப்டை' என்கிறார்கள். இவை பகல் நேரத்தில் கடிப்பவை. அதனால் நமக்குத் தெரியும். மழைநீரில் அல்லது குளிர்ப்பானப் பட்டி (ரிஃபிரி ஜிரேட்டர்), ஏ.சி ஆகியவற்றில் தங்கும் சிறிதளவு நீரில் கடி கொசுக்கள் மூட்டையிட்டுப் பெருகிவிடும். நகர்ப்புறங்களில் சிறுபாத் திரங்களில் இவை பெருகி, நோயைப் பரப்புகின்றன.

சாதாரணமாக, மருத்துவர்களிடம் ஜூரம் என்று போனால் மழகைக் காலத்தில் "இதெல்லாம் வரைஸ் ஃபீவர் (viral fever)" என்பார்கள். "அதுக்குப் போய் டெஸ்ட்" எல்லாம் பண்ண வேண்டாம்.... போய் மாத் திரை சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்கள்!" என்பார்கள்

அந்த 'வரைஸ் ஃபீவர்' தான் டெங்கு. பொதுவாக ஒரு நாள் காய்ச்சலுக்கே, என்ன சோதனை செய்யலாம் என வரமொழிகைகள் உள்ளன. நம் ஊரில் "எதுக்கும் எல்லாம் பாத் துடலாமே, டாக்டர்" என்று நோயாளிகள் தாமே முடிவு செய்வது தவறு.

மூதல் நாள் காய்ச்சலில் ஓரே ஒரு சோதனை போதும். (உச்சி மூதல் பாதம் வரை மருத்துவச் சோதித்தாலே பல மூறை காரணம் புரியலாம்). குளிர்ப்பானம் அல்லது கடுமையான தலைவலி ஏற்பட்டால் மலேரியா உள்ளதா எனச் சோதிக்கலாம். அது ஒன்று மட்டுமே 'பாசிப்பிவ்' ஆக இருக்கக் கூடும்.

டெங்குதானா என உறுதி செய்வது, அவசியமற்றது. அதற்கென பணம் செலவழிப்பது வீணம். ஏனெனில், டெங்கு காய்ச்சலுக்கெனத் தனிப்பட்ட மருந்துகள் ஏதும் கிடையாது. வறும் பக்கபலம் தரும் சிகிச்சை மட்டுமே போதும். மலேயம் 15 வயதுக்குட்பட்டோருக்கு மட்டுமே - அதிலும் 5% க்கும் குறைவானவர்களுக்கு மட்டுமே உயிருக்குத் தீங்கு ஏற்படும் அளவு பாதிப்பு ஏற்படலாம்.

□□□□□□ □□□□□□□□ :



இது கழந்தைகளை, அதாவது 15 வயதிற்குட்பட்டவர்களை மட்டுமே பாதிக்கிறது. இரூபாலரையும் ஓரே அளவில் தாக்குகிறது.

0000000000000000:

துவக்க நிலையில் காய்ச்சல், தொண்டை வலி, தலவைலி, பசியின்மை, கும்பட்டல், வாந்தி மற்றும் கடுமையான வயிற்று வலி ஆகியன ஏற்படும். 2-4 நாட்கள் வரை இது நீடிக்கும். ஆனால், classic dengue போல், தசை வலி, மட்டும் வலி மற்றும் எலும்பு வலி ஆகியன இராது.

சோதித்துப் பார்க்கையில் 38.30 to 40.60 (1010F \_ 1050F) காய்ச்சல், உள்நாக்கும் தொண்டையும் சிவந்த நிலை தவிர, நிணநீர் முண்டுகள் மற்றும் கல்லீரல் வீங்கியிருப்பது தடுவிய வரும்.

துவக்க நிலையை அடுத்து, உடல் நிலை வகை துரிதமாக மோசமடையும். உடல் சோர்வு மிகவும் அதிகரிக்கும். கைகால்கள் சில்லிட்ட போதும், உடல் மட்டும் வெப்பம் கொண்டிருக்கும். நற்றியிலும், கைகால் விரல் முன்கைகளிலும் புள்ளி புள்ளியாக கருதிக்கசிவு (petechiae) ஏற்படும். சில சமயம், தோலில் தடிப்புகள் அல்லது சிறு கொப்புளங்கள் தோன்றும். கைகால்கள் நீலமாகக் கட்டும். இதயத்துடிப்பு அதிகரித்து, ரத்த அழுத்தம் குறைந்துபோகும்.

4-5 வது நாளில் தான் பரம உயிர் இழப்பு நேருகிறது. ரத்த வாந்தி, கருத்த நிறத்தில் மலப்போக்கு, ஆழ்மயக்க நிலை மற்றும் உடன் தோத அதிர்வு நிலை ஆகியன கவலையளிக்கும் அறிகுறிகள். மச்சுத் திணறல், உடல் நீலம் ஆதல், வலிப்புகள் ஆகியன இறுதிக் கட்டத்தில் காணப்படும்.

0000000000 : டெங்கு வகை கன தனிப்பட்ட சிகிச்சை எதுவும் இல்லை. ரத்தச் சூழற்சி துவண்டு விடாமல் இருக்காமளவு நீரளவு உள்ளே செலுத்த வேண்டும்.

காய்ச்சல்கை குறைக்க போதிய அளவு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கருதிக்கசிவு ஏற்பட வட்டணுக்கள் (platelets) குறைவதே காரணம் என்பதால், அவற்றை ஈடுசெய்ய ரத்தம் \_ குறிப்பாக, வட்டணுக்கள் மட்டும் \_ செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

வட்டணுக்கள் சாதாரணமாக 2.0 லட்சம் முதல் 2.5 லட்சம் மி.மீ 3 என்ற அளவில் இருக்கும். அவை, ரத்தக் கசிவு உடலில் ஏற்படாமல் தடுப்பவை. அவற்றின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறையும் போது கருதிக்கசிவு ஏற்படக்கூடும்.

மருத்துவ ஆலோசனை கட்டாயம் தவே

0000000000 0000000000: டெங்கு வகை கன உடலில் தோன்றும் காப்பு மலங்களின் அளவுகளைக் (IgM Anti Body) கொண்டு, டெங்கு தானா என உறுதி செய்யலாம். இது வழக்கமாக எல்லா காய்ச்சல் வந்தவர்களுக்கும் செய்வது தவே இல்லை. பணம்தான் வீணாகச் செலவாகும்.

2) □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□இது குறையும் போது, ரத்தம் சலுத்த வண்பி இருக்கலாம்.

□□□□□□□ □□□□□□□□□□டெங்குவைக்கென துபுப்பிசிகள் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் மறேகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை வெற்றி கிட்டவில்லை.

நிச்சயமான ஓரே துபுபுமுறை, கொசுக்களை ஒழிக்கும் முறையே. மழைநீ ரையும், வீ டுகளில் துங்கும் நீ ரையும் அவ்வப்போது ஒழிப்பது மட்டுமே.

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ஒருமுறை டெங்குவினால் பாதிப்புற்ற பிறகு, துபுபுபுற்றல் அதிகரிக்கும். ஆனால், அதுத துமுறை 4 ஊன நீ ர் வகைகளில் வெறொரு வகை, டெங்கு நுண்ணி தாகும் போது, உதற காப்பு மபலம் விளவைக்கும் செயல்களால் மட்டுமே பெரும் தீ ந்குகள் ஏற்படும்.

அதாவது, நம்மகை காப்பதற்கென்று உள்ள காவல்துறை, வீ ட்டில் திருடன் நுழைந்ததற்காக வீ ட்டையே கொளுத்துவது போன்ற விளவைகள் ஏற்படும். இந்நிலை பெரும்பாலும் உடல் பலம் குறைவான குழந்தைகளில் \_ அதாவது நோஞ்சான் களிம் \_ ஏற்படுவதில்லை. நல்ல திடகாத் திரமான குழந்தைகளே பாதிப்புறுகின்றன. எனவே, நுத்த ர மற் றும் உயர் மட்ட வசதி கொண்ட குடும்பத் தினர் 'டெங்கு' என்றால் அலறுவது நியாயம் தான்! ஆனால், கொசுக்களை ஒழிப்பது நாமும் பங்களே க வண்பிய ஒரு பொது நல சுவை என பதகைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

சீ னாவில் மா சே துங் ஆட்சி துவங்கியபோது கொசுக்கள், பி ச்சிகள், எலிகள் இவற்றைக் கொல்வது நம் தலையாய கடமை என்றவாடன, மக்கள் வளுத்து வாங்கியதில், 'சுற்றுச் சீழல் சமநிலை இழப்பே (Ecological imbalance) வந்து விட்டது என்கிறார்கள். அந்த அளவு இல்லா விட்டாலும், கொஞ்சமாவது நாம் செயல்படலாம்... என்ன சார், சொல்லீ ந்க?...

<http://maruththuvam.blogspot.com/search/label/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%B2%E0%AF%8D>