

Written by

Saturday, 02 August 2008 12:38 -

இவ்வகையான சொறி அல்லது கரப்பானானது கப்டுதலாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் . ஈரமான அல்லது அழுக்கான உறிஞ்சுடை (நப்பி - Diapher) குழந்தைகளின் தலையில் சொறிவதை ஏற்படுத்துதல் .

நோயின் அறிகுறிகள் : உறிஞ்சுடை (நப்பி - Diapher) அணிந்த பகுதி சிவந்து போய் அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறப்பள்ளிகள் ஏற்பட்டு காணப்படும் .

0000000000000000 00000000 00000000 0000000000000000 00000000

உறிஞ்சுடை (நப்பி - Diapher)யை கழற்றிவிட்டு அப்பகுதியை காற்றூப்படி விடவேண்டும் . இவ்வகை நோய் ஏற்படாமலிருப்பதற்கு குழந்தை சிறுநீர் கழித்தபின் போ அல்லது மலம் கழித்தபின் போ ஓவ்வொரு முறையும் உறிஞ்சுடையை மாற்றிவிட வேண்டும் . அத்துடன் குழந்தையின் கீழ் பகுதியை நீரினால் சுத்தமாக கழுவி நன்றாக ஈரமின்றி துடைத்தபின்பு நீரத்தைக்கக்கப்படிய வகையை சார்ந்த அதாவது **Water Repellent Cream** வகையை சார்ந்த பால்டேட்டைப் பாவிக்க வேண்டும் .

இந் நோய் சில நாட்களின் பின்பும் மாறாமல் இருப்பின் உங்கள் மருத்துவரையோ அல்லது சுகாதார அதிகாரியையோ (**Health Visitor**) காணுவது சிறந்ததாகும் . சில வளக்கைகளில் அவர்கள் இந் நோயின் இரணத்தலை குறைப்பதற்கு **Mild corticosteroid** ஐ தரக்கூடும் .

Written by

Saturday, 02 August 2008 12:38 -

http://www.tamilhealth.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=92